



## La castration de votre chat

La castration de votre chat peut se réaliser **dès l'âge de 5-6 mois**. Elle consiste à lui retirer chirurgicalement les testicules afin qu'il ne puisse plus reproduire.

### *Pourquoi faire castrer votre chat ?*

La castration va permettre d'éliminer de nombreux désagréments liés à l'activité sexuelle de votre chat :

- elle permet de limiter, voire de supprimer le marquage territorial qui se traduit par des émissions d'urines sur les portes et les murs de votre maison
- un chat castré ne recherche plus les femelles, ce qui limite considérablement les bagarres avec d'autres chats, ainsi que les abcès consécutifs aux morsures ou aux coups de griffes
- le territoire d'un chat castré est beaucoup plus petit que celui d'un chat entier, ce qui limite les vagabondages et donc les risques d'accidents de la voie publique (première cause de mortalité chez les chats de moins de 2 ans)
- la diminution des morsures et la suppression de la reproduction **réduisent fortement le risque d'une contamination par le virus de la leucose féline (FeLV) ou du FIV (« sida » du chat)**
- la castration des chats contribue également à limiter la prolifération des chats errants

### *Quels sont les inconvénients de la castration ?*

La castration modifie le métabolisme hormonal de votre chat et peut **favoriser la prise de poids** chez certains chats.

Afin d'éviter ou de limiter cette prise de poids, nous vous conseillons de lui donner une **alimentation hypocalorique** adaptée à son nouvel état physiologique. Nous en discuterons ensemble lors de sa sortie d'hospitalisation.

## Avant l'opération

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une castration 1 à 2 semaines avant la date souhaitée de l'intervention.

Si cela n'a pas déjà été réalisé auparavant, il est fortement conseillé de profiter de la stérilisation pour effectuer **l'identification (puce électronique) de votre animal** : non seulement l'identification des animaux domestiques est obligatoire, mais surtout elle permet de retrouver votre animal en cas de fugue ou s'il était accidenté et incapable de rentrer chez vous par ses propres moyens. Il est également conseillé de profiter de l'anesthésie pour réaliser un **test de dépistage du FeLV (leucose) et du FIV (« sida » du chat)**.

La veille de l'intervention, retirez toute nourriture à partir de 20h. Vous pouvez laisser l'eau comme boisson jusqu'au rendez-vous opératoire. Veillez à ce que votre chat ne puisse sortir de la maison (afin d'être sûr qu'il soit bien à jeun le matin de l'opération).

## Déroulement de l'opération

Il s'agit d'une intervention chirurgicale en ambulatoire (sur la journée). L'intervention de votre chat se déroulera le matin à partir de 8h30.

Avant l'intervention, le vétérinaire vérifiera par un examen pré-opératoire que votre chat est en bonne santé et que l'anesthésie ne présente pas de risque particulier.

Une injection de produit anesthésique adaptée à son poids est ensuite réalisée par voie intra-musculaire. Lorsque votre chat dort, il reçoit une injection d'antibiotique et d'anti-inflammatoire puis il est préparé pour l'intervention chirurgicale.

L'intervention consiste à extraire les testicules des bourses. Le canal déférent et les vaisseaux sanguins sont ensuite ligaturés et sectionnés et les testicules enlevés.

Après l'intervention, votre chat est placé dans un box de réveil et il est surveillé par une assistante vétérinaire jusqu'à son réveil complet.

## Soins post-opératoires

En fin d'après-midi, votre chat est suffisamment réveillé pour que nous vous le rendions sans risque prévisible (étant entendu que tout signe suscitant une interrogation ou une inquiétude de votre part doit vous amener à prendre contact avec la clinique).

À votre retour, installez-le dans un endroit calme et chaud. Vous pouvez lui proposer de l'eau mais faites-le boire par petites quantités. Et s'il vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la moitié de sa ration habituelle. Votre chat doit avoir complètement récupéré dans 24 à 48 heures.

Pendant les 3 jours qui suivent sa castration, ne pas le laisser sortir et remplacez les granulés de sa litière par du sopalin ou du papier journal que vous changerez tous les jours (pour éviter que des saletés ne se collent à la plaie).

Cette intervention ne nécessitant qu'une très petite incision, il n'y a pas de pansement, ni de fils à faire retirer.

*Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toutes interrogations et pour prendre rendez-vous.*